

11-15 Ağustos 1986 Kimberlit (4. Uluslararası konferans) Perth — BATI AVUSTURALYA
13-20 Ağustos 1986 Toprak bilimi (13. ISSS Uluslararası kongresi) Hamburg — FEDERAL ALMANYA

17-22 Ağustos 1986 Pasifik çevresi Enerji ve Maden Kaynakları (Konferans) SİNGAPUR

18-22 Ağustos 1986 Cevher yataklarının kökeni Uluslararası birliği (7. simpozium) Lulea — İSVEÇ
24-30 Ağustos 1986 Uluslararası sedimentologlar birliği (12. Uluslararası kongre) Canberra — AVUSTRALYA

25-30 Ağustos 1986 Dünya-Ay ve gezegenlerin şekli ve dinamiği (Uluslararası simpozium) Prag — ÇEKOSLAVAKYA

30 Ağustos - 5 Eylül 1986 Buz kimyası ve fiziği (Simpozium) FRANSA

Eylül 1986 Karmaşık kayaç topluluklarında Mühendislik (Uluslararası simpozium) Beijing — ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Eylül 1986 Sig tetis 2 (Uluslararası simpozium) Wagga Wagga — NSW AVUSTRALYA

16-23 Temmuz 1987 Cephalopodlar (Bogaz ve okyanus) 20. Uluslararası Kongre Antalya — TURKEY

Özler

TOROS KUŞAĞINDA OFİYOLİT ÜZERLEMESİ HAKKINDAKİ JEOLOJİK VE JEOKRONOLOJİK SINIRLAMALAR

Geological and Geochronologic constraints for Ophiolite Obduction in the Taurus Belt (TURKEY)

H. Whitechurch, J. Marcoux, T. Juteau, I. Reuber, Y. Lagabrielle, R. Montigny

Terra Cognita. Vol 5 No. 2-3, 1985 (EUG - III), p. 127 (Abstract)

Ofiyolitlerden elde edilen jeokronolojik ve yapısal veriler ile platform istifinden bazen ofiyolit-altı pencerelarından bazen tektonik dilimlerdeki istiflerden teleskoplama yoluyla sağlanan stratigrafik ve yapısal veriler. Toros kuşağındaki ofiyolit üzerlemesi ve onu izleyen bindirmeler hakkında jeolojik sınırlamaları belirlemektedir. Bu bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

YATIRIMLARDA OFİYOLİTERDE. 1) Senonyen-öncesi devirde N-S doğrultulu transformlarla ötelenen D-B uzanımlı yüksüm (akresyon) zonunda ofiyolitler oluşmuşlardır. 2) Tetis okyanus kabuğunun okyanus-içi dilimlenmesi 104-90 M.Y. aralığında olmuş, böylelikle gelecekteki metamorfik temel ile harsburjtlerdeki düşük-sıcaklık foliasyonu gelişmiştir. Kuvarsitlerdeki mikro-strüktürel analizler sistematik olarak bindirme yönünün kuzyeden güneye doğru olduğunu belirtmektedir. 3) Tüm ofiyolit istifini ve lokal olarak bazen metamorfik temeli de kesen fakat platform

7-12 Eylül 1986 Buzul biliminde uzaktan algılama (Simpozium) Cambridge — İNGİLTERE
8-12 Eylül 1986 Paleokokyanuslar (2. Uluslararası Konferans) Woods Hale — A.B.D.
5-11 Ekim 1986 Dünya enerjisi (13. Kongre) Cannes — FRANSA

20-26 Ekim 1986 Uluslararası mühendislik Jeoloji birliği (5. Kongre) Duenos Aires — ARJANTİN 1987

31 Temmuz - 9 Ağustos 1987 Uluslararası Kuva tener araştırmaları birliği (12 Kongre) Ottawa-Ontario — KANADA

9-22 Ağustos 1987 IUGG (XIX Genel toplantı) Vancouver — KANADA

30 Ağustos - 4 Eylül 1987 Uluslararası Kaya mekanığı birliği (6. Uluslararası kongre) Montreal — KANADA

7-11 Eylül 1987 Karbonifer stratigrafisi ve jeoloji (11. Uluslararası kongre) Beijing — ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Müracaat adresleri Episodes'da mevcuttur.

Hazırlayan : Ussal Z. ÇAPAN

istifini hiçbır yerde kesmeyen izole, toleyitik yay tipi dayklar Kampanyen sırasında (80-75 M.Y.) sokulum yapmışlardır. 4) Antalya'da üzerleme tektonигine göre üç adet ofiyolit-üstü sedimanter istif ayırdedilmişdir, bunlар: a) üzerleme-öncesi evreye ait, yalnız ofiyolit klastlar içeren intra-formasyonel bresler ve fay döküntüsü olan breş kamalarıdır. b) Ofiyolit kahıntıları üzerinde uyumsuz olarak duran, fay döküntü breslerinin doğrultu atımlı fay hareketleri ve yükselmelere bağlı olarak yeniden işlemesile oluşan üzerleme ile eşzamanlı erken turbiditler. c) Rüdistler ve bitki kalıntıları ile yaşı Orta Mestrihtyen olarak saptanan, kita kenarının distal bölgelerinde ofiyolit dilimlerinin ani, ilk gelimleriyle ilgili sig-su turbiditleri.

Platform istifinde. 1) Mezozoyik sırasında, okyanusa doğru Triyas rıftleşmesi ile geçişli olarak platform karbonat çökelim. 2) Pelajik fasiyez çökelimine yolaçan ani Senonyen çökmesi. 3) Kampanyen

Mestrihtiyen aralığında ilk olistostrom çökelimi. Ofiyolitik bloklar lokal olarak platform istifinin üst kesiminden gelen karbonat blokları ile birlikte bulunmakta ve ofiyolit bloklarının ofiyolit istifinin alt kesimine ait oluşu, ofiyolitin üst kısmının çoktan aşındırılmıştır.

TOROS DAĞLARINDA (TÜRKİYE) OFİYOLİT YERLEŞİM BİÇİMLERİ

Contrasting Modes of Ophiolite Emplacement in the Taurus Mountains, Turkey

A. H. F. Robertson, G. Aktaş, J. W. F. Waldron ve N. H. Woocock

Terra Cognita, Vol. 5, No. 2-3, 1985 (E.G.U. III), p. 125 (Abstract)

On yılı aşan ayrıntılı arazi çalışmalarından sonra Toros Dağlarında ofiyolit karmaşıklarının bir tek Mezozoyik Neotetis okyanus baseninden türemesinin imkansız olduğu bugün açıkça anlaşılmıştır. Bu görüş yerine, mikro-kitalar, karbonat platformları ve küçük okyanus basenlerinin yeraldığı karmaşık bir mozayik modeli önerilmiştir. Yerleşim biçimlerinin çeşitliliği bu tür karmaşık bir paleocoğrafyanın doğal sonucudur. Birkaç ofiyolit karmaşığında yapılan, yeterli ayrıntıdaki çalışmalara göre dört önemli yerleşim biçiminin varlığı gözlenmiştir:

1) İnce kabuk (bindirme) tektoniği. Orta ve Doğu Toridlerde ofiyolitler oldukça ortogonal şekilde, çökmüş Mezozoyik pasif kıyı kenarı üzerine güneye doğru yerleşmişlerdir (örneğin Bolkar Napları ve Besni Olistostromu gibi). GB Türkiye'de Arap kenarı üzerine yerleşme örneğin Oman Dağlarında Semail Napının yerleşimi ile paralel tutulabilir. Bitişik kenarların, çok daha sonraları ortaya çıkan ana kıyı çarpışmasına ait hiçbir iz taşımıadına göre, bir açık deniz olması gereklidir.

BORAT ARAMALARINDA STRONSYUMUN OLASIL KULLANIMI: BİGADİC VE EMET BASENLERİNDEN ÖRNEKLER

Possible Use of Sr in Borate Exploration: An Example from Bigadiç and Emet Neogene Basins of Turkey

M. Niyazi Gündoğdu ve Hüseyin Yalçın

Terra Cognita, Vol. 5, No. 2-3, 1985, (E.G.U.-III) p. 297 (Abstract)

Kuzeybatı Anadolu'da yer alan Bigadiç ve Emet Neojen basenleri Türkiye borat rezervinin önemli bir kesimini oluşturmaktadır (yaklaşık 1.5 milyar ton).

Bigadiç baseninde borat yatakları birbirinden klinoptilolitli camlı tüflerle ayrılmış iki üyede (Uzun-

düğünü belirtmektedir. Üst Mestrihtiyen-Paleosen konglomeralarının çökeliminden önce platformun distal kesimlerinin yerleşimini tamamlamış olan ofiyolit birimleri ile birlikte Mestrihtiyen sonuna doğru kıyı üzerine yerleşmesi.

YERLEŞMESİNDE ÇELİŞİK

—oo—

2) Burkulma «Wrench» ve bindirme tektoniği. Okyanus basenlerinin, önemli bir oblik bileşen içerecek açıldığı yerlerde, sonraki ofiyolit yerleşimleri daha çok burkulma (Wrench) ve bir ölçüde de bindirme tektoniği ile kontrol edilmektedir (örneğin Antalya karmaşığı). Serpantinit diyapirizmi ve doğrultu-atım'la ortaya çıkan «geçici (ephemeral) basenler» önemli roller oynamaktadır.

3) Hendek-Yığışım Karmaşığı. Neo-tetis kabuğının daha çok kuzeye doğru yitimi GD-Türkiyede, önemli ofiyolit dilimleri de içeren ana yığışım karmaşıklarının oluşmasına neden olmuştur (örneğin Guleman Ofiyoliti ve Maden Karmaşığı). Trans-tansiyonel tektonik Orta Tersiyerdeki basen kapanımının geç evrelerini etkilemiştir (Andeman Denizi tipi).

4) Çarpışma tektoniği. Büyük ve küçük ölçekte kitasal çarpışmalar Kretase sonundan başlayarak bu güne kadar, ofiyolitleri bitişik kıyı kenarları üzerinde daha ilerilere ötelemiş (örneğin Kızıl Dağ. Eğridir) ve aflormanın karmaşaklığını daha da artırmıştır.

—oo—

F. D. Müh. Fak. Jeoloji Müh.
Bölümü ELAZIG
P. O. Müh. Fak. Jeoloji Müh.
Bölümü ELAZIG
tepe ve İskelen bulunan Emet baseninde ise borat oluşumu zeolitli camlı tuf ve detritik birimlerin üzerinde yer alır. Killi (stevensit ve sanonit) ve karbonatlı (kalsit, dolomit, aragonit ve manyezit) birimlerin ardalanmasından oluşan bu formasyonlardaki

ana borat mineralleri; Bigadiç baseninde kolemanit, üleksit ve probertit; Emet'te kolemanit ve üleksittir.

Bu çalışmada Uzuntepe, İskele ve Emet formasyonlarında; sondaj karotu ve yüzey kesitlerinden alınan örnekler üzerinde karbonat borat ve simektit minerallerinde Sr'un dikey dağılımı incelenmiştir. Sonuçta Sr'un en önemli konsantrasyona boratlı zonda ulaştığı belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle; üç birimde de Sr konsantrasyonu alttan itibaren artarak boratlı zonda maksimum bir değere ulaşmakta, sonra tekrar azalmaktadır. Örneklerin mineralojik bileşiminden bağımsız olan bu tür bir dağılım; bir yandan Sr'un borlu hidrotermal çözeltiler ile birlikte getirildiğini vurgulamakta, diğer yandan borat yataklarının aranmasında kullanılabilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Borat minerallerinin yüzeysel koşullarda bozunması (özellikle karbonatlaşması), ayrıca çok sık gözlenen fasiyes değişimleri yatakların aranmasını güçlendirmekte; sondaj, galeri ve yarma gibi daha pahali yöntemleri gerekliliğine neden olmaktadır. Bu çalışmada önerilen Sr yöntemi ise kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde sonuca gidilebilmesi bakımından son derece önemlidir. Yöntemin uygulanmasında izlenecek yol; yüzeyden ölçülen kesitler boyunca karbonatlı veya killi-karbonatlı seviyelerde sık aralıklarla (örneğin 5-10 m.) alınan örneklerin karbonat fraksiyonunda Sr çözümlemesi yapmak ve bunun istifteki dikey dağılımını incelemek yeterlidir.

—Oa—

DOĞU PONTİDLERDEKİ (TRABZON, KD - TÜRKİYE) VOLKANİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

Geochemistry and Geochronology of Volcanic Rocks from Eastern Pontids (Trabzon, NE Turkey)

M. Barbieri, G. Galderoni, V. Ferrini, U. Masi

Terra Cognita, Vol. s. No. 2-3, 1985, (EUG-III) 5-280 (Abstract)

Kuzey Türkiye Pontik magmatik provensine ait 24 volkanik kayaç örneği majör ve iz elementler için analiz edilmiştir. Seçilen örneklerin K/Ar yaşları ve ilksel izotopsal oranları ölçülmüştür. İncelenen bazik kayaçlar içinde SiO_2 , K_2O diyagramındaki dağılım biri toleyitik diğeri kalkalkali olmak üzere iki farklı grubun var olduğunu ortaya koymustur.

Volkanik kayaçların K/Ar yaşları 101-44 M. Y. öncesi arasında değişmektedir ancak birçok kayaçta post-magmatik süreçlerin orijinal K/Ar oranlarını

değiştirdiğine ait kanıtlara rastlandığı unutulmamalıdır.

Son olarak ilksel $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ oranları bazik kayaçlar için 0.70436 ± 2 ile 0.70569 ± 2 , asit kayaçlar için ise 0.70380 ± 2 ile 0.71228 ± 2 arasında değişmektedir. Bu değerler, bazik kayaçlar için derin magma kaynak-bölgelerini belirtmekte, daha geniş aralıklı asit kayaçlar için ise kayaçlarla karbonat-yıkılmış (carbonate leaching) hidrotermal sıvılar arasında etkileşim olduğunu belirtmektedir.

Yeni Yayınlar

Kimmerid Orogenik Sistemi ve Avrasyanın Tektoniği

(The Cimmerid Orogenic System and the tectonics of Eurasia)

A. M. C. Şengör Geological Society of America, Special Paper 195, 1984. 82 sayfa ve harita, 17 dolar.

Kimmeridlerin foreland ve hinterlandı ile birlikte evriminin anlaşılması, şüphesiz Asya ve Doğu Avrupa'nın Mezozoyikteki tektoniğinin anlaşılmasına ışık tutmakta ve örneğin «gizli yitme» (hidden subduction) vb. gibi kitasal evrimi ilgilendiren birçok ilginç kav-

ramın anlaşılmasına yardım etmektedir. Öte yandan Kimmeridlerin anlaşılmasındaki düşünce ve yorumların evrimi de kitapta incelenmekte ve böyleselikle Kober-Stille okulunun «fiksist» felsefesinin etkisi altında ne kadar çok kalındığı ilginç bir şekilde ortaya